20

Observation Sur la Naissance d'un Enfant Mâle pourvû de quatre Cuisses, jambes et pieds.

Le 21 May 1764 la femme du nommé george ignace preniz meunier au Village d'oudervillers dans la principauté de Bâle, baillage de delemont, accoucha d'un garçon après un travail des plus laborieux, Cet Enfant d'une grosseur Considerable, et dont toutes les parties très bien figurées et dans leur Etat naturel, Etoit en outre pourvû de des Extrémités inferieures qui Sortoient de la partie moyenne et Superieure de la region Epigastrique, les fesses Se presentoient Exterieurement et laissoient appercevoir par une ligne brunatre la place d'un anûs imperforé, et en dessous, et a la place naturelle la Verge et le Scrotum, mais Sans testicules, les jambes repliées en dedans et les talons de même; les quelles parties ne pouvoient Souffrir aucune Extention, la jambe droitte plus Courte que la gauche d'environ un demi poûce, le genoüil plus grêle et le pied du même Coté pourvû de Sept orteils dont Cinq, y Compris le gros, dans leur rang naturel, mais moins fendus que Ceux du pied Gauche, et deux Surnumeraires plus grands que les autres Situés a Coté du gros: tout Cet assemblage formant la moitié inferieure d'un autre Corps, Etoit attaché a la distance de trois bons doigts au dessûs de l'ombilic par une Espêce de Col de la grosseur d'un bon poûce revetû des teguments Communs; Cet Enfant avoit en outre le nombril destitué des muscles et teguments de deux bons poûces de diametre, en sorte que les intestins Seulement recoûverts du péritoine Sailloient en dehors du Volume d'un bon oeuf d'oye.

Ayant été mandé pour rémédier, autant que possible, a Ce triste Etat, je fis un Examen reflechi de toutes Ces irregularités de nature, je Cherchai premierement a parer au deffaut de l'ombilic; ayant preparé a Cet Effet une petitte pelotte en forme de Champignon avec de la Cire molle, je fis rentrer les intestins dans le Ventre et rapprochai les brides du nombril, y posai le Champignon, une Compresse et un bandage roulé pour Contenir le tout.

Quant a l'Excés en nombre des parties dont l'Enfant Etoit Composé, m'appercevant qu'Elles n'attenoient au Corps que par une base Etroitte et mollasse, je me persuadai qu'Elle ne pouvoit servir qu'au passage des Vaisseaux necessaires a la nourriture de Ces parties, et me determinai a y faire une ligature mediocrement Serrée. obligé de retourner a pourrentruy lieu de ma residence Eloigné de Cinq lieues dud Village, je recommandai au Chirurgien de l'Endroit qui pratique un peû la Chirurgie, de serrer tous les jours et peû a peû la ditte ligature, affin d'intercepter insensiblement la Circulation; et par la faciliter la Chutte desdittes parties.

Le 30. dudit mois le pere de l'Enfant m'Ecrivit qu'on avoit Executé de point en point tout Ce que j'avois prescrit, que l'ombilic Etoit presque recouvert, et que le Col ou j'avois pratiqué la ligature n'Excedoit plus le tube d'une plume a Ecrire, que l'Enfant Se portoit très bien et n'avoit d'autre jncommodité apparante, que Celle que luy ocasionoit Cette masse Excédante sur l'Estomac et le bas ventre; il me demandoit mon avis sur Ce qu'il y avoit a faire pour l'en delivrer Entierement.

Sur Cet allegué ne pouvant me transporter sur les lieux, eu Egard a des occupations pressantes, je ne ballançai point a luy mander qu'il falloit Extraire

ARC 26 2020

Ces parties a un doigt audessus dela ligature, Scavoir, Couper dans l'Excedant, avoir soins auparavant de bien serrer la ditte ligature, pour en Cas d'hemorragie Se rendre maitre du Sang, faire ensuite une Embrocation Sur tout le Ventre et appliquer des topiques Convenables que je luy indiquai a Cet Effet,

Le 31 ledit Sr Fourtier luy fit l'amputation, et Executa Ce que j'avois prescrit, il ne Survint ny accident ny hemorragie; l'Enfant ne Sourcilla pas meme dans l'operation, dormit parfaittement toutte la nuit, Ce qu'il ne faisoit que difficillement auparavant, et prit Ses differens alimens, ainsi que l'Enfant le mieux portant.

Le 5e Juin on m'apporta a pourrentruy, ainsi que je l'avois recommandé, les parties qui avoient Etés Enlevées, malgrez l'Envie que j'avois de les Conserver En leur Entier, la Curiosité, de Scavoir leur Composé, d'ou Elles pouvoient tirer leur nourriture, et Ce qui Etoit Contenües dans l'intervalle depuis leur base jusqu'au Scrotum par devant, et l'anus par derriere, m'Engagea a dissequer Et parcourrir le tout avec Exactitude. mais quelle fut ma Surprise d'avoir reconnus une Espèce de rectum tres bien figuré, s'Etendant jusqu'a l'anus, remplis de matieres brunatres, et Ce Canal de la grosseur d'un doigt, une membrane assés Epaisse remplie d'une infinité de petits filets vasculeux, la quelle regnoit dans toutte la longueur de Ce Viscère et aboutissoit a deux vaisseaux Envelopés dans les graisses dont le bassin Etoit remplis; je pris Consequemment Cette membrane pour un Espece de mesentère; vers la partie moyenne de Ces deux Canaux Sortoient les Vaisseaux Spermatiques, qui s'inseroient aux testicules droit et Gauche, Ces testicules occupoient la place des Vessicules Seminaires dans l'homme parfait; la Vescie Etoit Comme raccornie et pouvoit avoir la grosseur d'une bonne noisette, le Canal de l'uretre ouvert depuis l'Extrémité du gland jusque dans la ditte Vescie, le Scrotum ne renfermoit que des graisses Soutenües dans des Cellules membraneuses; un peu audessus des vaisseaux Spermatiques Sortoient les Emulgens qui venoient s'inserer de droit et de gauche a deux petits Corps glanduleux Envelopés de beaucoup de graisses, Ces Corps ayants la figure des reins pouvoient faire le volume d'une bonne faive applattie, les os qui Seuls Concourroient a la formation du bassin, Etoient les ileum, ischion et pubis; Ces derniers ne formans qu'une arcade Cartilagineuse, les ileums unis Ensemble par denteluré, Et il n'y avoit point d'os sacrum. Ces Extrémités quoyque fort grosses, ne renfermoient Sous leur tegumens que des graisses Contenües dans des Cellules membraneuses, et l'on n'apperçevoit des fibres charnües que vers la partie moyenne des jambes, dont Elles Etoient Envelopés, et d'ou partoient les tendons tant flechisseurs, qu'Extenseurs des pieds et des orteils, tous les os de Ces Extrémités très bien figurés et dans leur nombre naturel, Excepté le pied droit qui, Comme il Est dit Cy dessus, Etoit pourvû de Sept orteils

Suivant mon Examen de Ce qui faisoit la Composition de Ces parties, je me persuadai que Cet Enfant pouvoit avoir les intestins doubles, ou du moins qu'un petit Canal intestinal partoit de l'Estomac, ou de quelqu'uns des intestins pour s'y inserer, que se portant jusqu'a l'anus, le quel se trouvoit imperforé il se

faisoit un mouvement antiperistaltique pour rapporter les Excremens, ou dans
l'Estomac suivant ma supposition, ou dans le Canal intestinal naturel;
(les Especes de matiere fecales que je trouvai dans ce pretendus intestin ressembloient
parfaittement a un meconium gras et onctueux) je Concluai donc que n'ayant
dans mes recherches trouvé que très peu de Vaisseaux sanguins et de fibres
Charnues, que ces parties recevoient une nourriture plus Chileuse que sanguine,
par la Communication des petits vaisseaux dont etoit parsemée la
membrane attenante a ce Canal, a laquelle j'ai donné le nom de mesentere;
que touttes les petittes ramifications venoient se degorger dans un des vaisseaux,
dont il est fait mention, du Chil qu'elles Contenoient, ensorte que les vaisseaux
qui se distribuoient dans ces extremités, portans une nourriture plus Chileuse
que sanguine, deposoient dans les Cellules membraneuses cette substance ferme,
blanchatre et onctueuse semblable a du suif dont elles etoient remplies;
que le residu de cette même nourriture etoit rapporté dans l'autre vaisseau
pour etre ensuite transferé dans le torrent de la Circulation. (le foetus
qui dans les derniers mois de son sejour dans la matrice se nourrit par le
Cordon ombilical et par la bouche, ce qui est prouvé par le meconium que
l'on trouve après sa mort dans les gros intestins et même l'ileum, qui y tient
lieu de Matieres fecales et qui ne peut venir que de l'amnios) cette raison
me prouvoit la separation chileuse qui se faisoit par les petits vaisseaux
du pretendus mesentere, et me soutenoit dans ma Conclusion.

Le 13 du Courrant l'Enfant mourut vers les 10 heures du soir, l'ayant appris
je me transportai sur les lieux, je vis avec plaisir l'ombilic, ainsi que la
place qu'occupoient les parties extraites très bien refermées et cicatrisées, je fis
l'ouverture de cet Enfant avec exactitude, et ce fut par ce moyen que je
trouvai touttes mes suppositions faußes, cet excédant ne recevoit sa nourriture
qu'au moyen de deux branches d'artere qui partoient des ombilicalles, et d'une
grosse branche de la veine, près de leur sortie de l'ombilic, cette derniere formoit
ce Canal que je pris pour un rectum, et les deux branches d'artere, etoient les
deux vaisseaux qui l'accompagnoient, ils rampoient l'un et l'autre, entre le
peritoine et les muscles droits pour s'inserer dans ledit excédant, tous les Visceres
du bas ventre etoient dans leur etat naturel et n'avoient soufferts aucune
alteration, le foye tres sain; ce qui me surprit est que la veine ombilicalle,
au lieu de penetrer dans le foye par sa fente anterieure pour se vuider
dans le sinus de la veine porte du sang et suc nourrissier dont elle rapportoit
le residu; entroit par la partie inferieure de son grand Lobe, se partageoit en
deux branches et parcourroit en ligne directe ce viscere pour venir se degorger
dans ledit sinus.

M'etant informé des accidents qui avoient precedé la mort de l'enfant, on
me dit qu'il avoit eu un rhume très violent l'espace de trois jours, qu'il etoit
mort dans convulsion, qu'il avoit cessé de teter et de prendre toutte nourriture

depuis la Veille de sa mort et qu'il s'Etoit Eteint Comme une Chandelle.
j'ouvris la poitrine, et trouvai tous les Visceres qu'Elle renferme tres sains,
a l'Exception du poûmon gauche qui Etoit En partie Enflammé, et il n'y avoit
aucun Epanchement dans la Capacité de la ditte poitrine.

On taxera peut Etre de témérité d'avoir tenté une telle operation; je ne
l'aurois Certainement point pratiquée, si je n'Etois Envisagé que Cette base
Etroitte et mollace qui unissoit Ces parties au Corps de l'Enfant ne pouvoit
servir qu'au passage des Vaisseaux necessaires a leur porter la nourriture,
et C'Est aussi Cette meme indication qui me fit préferer la ligature a tout
autre moyen, affin d'y intercepter insensiblement la Circulation; l'Evénement
En a Eté heureux, puisque la place qu'occupoit Ces Extrémités a Eté tres bien
Cicatrisée, de plus l'Enfant a Vecu Vingt trois jours depuis la ligature faitte,
sans qu'on n'ait apperçu aucun accident, et l'on Voit par le detail que
je fais de mes recherches dans l'ouverture du Cadavre, que le seul poûmon
gauche s'Est trouvé affecté, maladie qui ne luy Est survenüe que les
derniers jours de sa Vie; Cette ligature au reste doit Etre regardée Comme
la même qui se pratique aux Vaisseaux ombilicaux, puisqu'Elle ne
Comprenoit que leur ramification et les téguments.

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C. N.

Le Soussigné a Cru devoir joindre a la presente observation, un dessein
ou l'on Voit l'Enfant, tel qu'il Est Venû au monde.

a Porrentruy ce 6 Juillet 1764

Godin Chirurgien de Son
Altesse Monseigneur le
Prince Evêque de Bâle

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
BIBLIOTHÈQUE